

성인 백신 접종

백신을 접종하기에 결코 늦지 않은 나이입니다!

백신 접종은 평생 동안 생명을 지키는 일입니다. 필요한 모든 백신을 접종했는지 담당 의료서비스 제공자에게 꼭 확인하십시오.

백신	필요할까요?
코로나-19	예! 모든 성인은 코로나-19 백신 접종을 최신 상태로 유지해야 합니다. 담당 의료서비스 제공자와 상의하십시오
A형 간염 (HepA)	글쎄요. A형 간염*에 대한 특정 위험 요인이 있거나 단지 이 질환에 걸리는 것을 원치 않는 경우 이 백신을 접종해야 합니다. 백신은 대개 6-18개월 간격으로 2회 용량이 투여됩니다.
B형 간염 (HepB)	예! 백신 접종을 받지 않은 60세 미만의 모든 성인은 브랜드에 따라 2회 또는 3회 용량의 B형 간염 백신을 접종하는 것이 권장됩니다. 60세 이상이고 특정 위험 요인이 있는 경우* 또는 단순히 감염으로부터 보호받고자 하는 경우에도 이 백신 접종이 필요합니다. 모든 성인은 적어도 한 번은 혈액 검사를 통해 B형 간염 감염 여부를 검사해야 합니다. 담당 의료서비스 제공자와 상의하십시오.
헤모필루스 인플루엔자 b형(Hib)	글쎄요. 특정 고위험 질환을 앓고 있는 일부 성인들은 Hib 백신 접종을 받아야 합니다. 담당 의료서비스 제공자와 상의하여 이 백신이 필요한지 알아보십시오.
인유두종 바이러스 (HPV)	예! 26세 이하인 경우 이 백신 접종을 받아야 합니다. 27~45세의 성인도 담당 의료서비스 제공자와 상의한 후 HPV 백신 접종을 받겠다고 선택할 수 있습니다.* 백신은 첫 번째 용량 투여 시 나이에 따라 보통 2회 또는 3회 용량으로 투여됩니다.
인플루엔자(독감)	예! 매년 가을이나 겨울에 인플루엔자 백신 접종을 받아야 합니다.
홍역, 볼거리, 풍진 (MMR)	글쎄요. 1957년 또는 그 이후에 태어난 경우 적어도 1회 용량의 MMR을 접종해야 합니다. 또한 2차 접종이 필요할 수도 있습니다.* 임신부와 면역 체계가 심하게 약화된 사람은 MMR을 접종하지 말아야 합니다.*
수막구균 ACWY (MenACWY, MenABCWY)	글쎄요. 여러 질병* 중 하나가 있다면 MenACWY 백신 접종이 필요할 수 있으며 위험이 지속되면 추가 접종도 받아야 합니다. 기숙사에 거주하는 대학 1학년생이고 (1) 16세가 된 후 백신을 접종받지 않았거나 (2) 마지막 접종 후 5년 이상이 지난 경우, 이 백신도 접종해야 합니다. 19세에서 21세 사이의 모든 사람은 16세가 지난 후 접종을 하지 않았다면 후속 접종을 받을 수 있습니다. MenABCWY 병용 접종은 MenB 백신과 MenACWY 백신이 모두 필요한 경우에 해당하는 옵션입니다.
수막구균 B (MenB, MenABCWY)	글쎄요. 여러 질병* 중 하나가 있다면 MenB 백신 접종이 필요할 수 있으며 위험이 지속되면 추가 접종도 해야 합니다. 귀하가 16세에서 23세인 경우, 고위험 질환이 없더라도 의료서비스 제공자와 MenB 백신 접종에 대해 상의할 수 있습니다. MenABCWY 병용 접종은 MenACWY 백신과 MenB 백신이 모두 필요한 경우에 해당하는 옵션입니다.
엠폭스	글쎄요. 귀하가 엠폭스에 감염된 사람에게 노출되었거나 노출이 의심되는 경우, 또는 엠폭스에 대한 노출 위험을 증가시키는 특정 생활을 하는 경우, 엠폭스 백신(Jynneos)을 2회 용량으로 연속해서 접종해야 합니다.* 의료서비스 제공자와 상의하십시오.
폐렴구균(PCV, PPSV23)	예! 50세 이상의 모든 성인은 폐렴구균 백신 접종이 필요합니다. 특정 기저질환이나 기타 위험 요인*이 있는 50세 미만의 성인도 폐렴구균 백신 접종이 필요합니다. 과거에 백신 접종을 받은 사람들에게는 이제 새로운 백신이 권장될 수 있습니다. 필요한 경우, 담당 의료서비스 제공자가 어떠한 백신이 필요한지 결정할 수 있습니다.
호흡기 세포융합 바이러스(RSV)	예! 귀하가 75세 이상이거나, 60~74세이고 중증 RSV 위험이 높은 경우, 본 일회성 백신을 접종받아야 합니다. RSV로부터 영아를 보호하려면, 임산부가 Abrysvo(Pfizer) RSV 백신을 접종하거나 영아에게 RSV 예방 항체(nirsevimab)를 투여해야 합니다.
파상풍, 디프테리아, 백일해 (Tdap, Td)	예! Tdap을 접종한 적이 없다면 지금 Tdap 접종해야 합니다. 그 후에는 10년마다 Tdap 또는 Td 추가 접종을 해야 합니다. 여러분의 생애에서 적어도 3회의 파상풍 및 디프테리아 독소이드 함유 주사를 맞지 않았거나 깊은 상처나 더러운 상처가 있는 경우 담당 의료서비스 제공자와 상의하십시오.
수두 (물마마)	글쎄요. 수두를 앓은 적이 없고, 백신 접종을 받은 적이 없거나, 백신을 접종했지만 1회 용량만 투여했다면, 담당 의료서비스 제공자와 상의하여 이 백신 접종이 필요한지 확인하십시오. 임신부와 면역 체계가 심하게 약화된 사람들은 수두 백신 접종을 받지 말아야 합니다.
대상포진 (띠헤르페스)	예! 19세 이상이며 면역 체계가 약해진 경우, 또는 50세 이상인 경우, Shingrix 브랜드의 대상포진 백신을 2회 용량으로 연속해서 접종해야 합니다.

* 담당 의료서비스 제공자와 상의하여 감염 위험 수준과 이 백신에 대한 필요성을 결정하십시오.

미국 밖으로 여행을 떠날 예정이십니까? 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 웹사이트(wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list)를 방문하여 여행 정보를 참조하거나 여행 진료소 담당자와 상의하십시오.



www.immunize.org/wp-content/uploads/catg.d/p4030-kor.pdf

"Vaccinations for Adults"

Item #p4030-kor Korean (10/30/2024)



Scan for PDF